

Thuốc tránh thai khẩn cấp là gì

Thuốc tránh thai khẩn cấp là gì

Kháng sinh tránh thai cấp tốc là phương pháp ngừa thai cho hiệu quả lên tới 90% trong tầm 120 giờ (5 ngày) hoặc 72 giờ (3 ngày) tùy kiểu thuốc sau khi phát sinh quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Song, chị em phụ nữ chỉ cần phải dùng kháng sinh phòng tránh thai trong giới hạn đồng ý, Nếu mà sử dụng nhiều quá mức có nguy cơ bắt gặp tác dụng phụ với nhiều hậu quả sức khỏe.

Nội dung dưới đây được trả lời chuyên môn vì ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, bác sĩ chuyên khoa Trung tâm phụ khoa bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về *Thuốc tránh thai cấp bách*, biện pháp dùng thuốc hợp lý Nhằm tránh một số phản ứng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe cùng với chức năng sinh sản của nữ.

Thuốc tránh thai cấp bách là gì?

Kháng sinh phòng tránh thai cấp bách (Emergency Contraceptive Pills) là giải pháp phòng tránh thai được dùng dưới khi nảy sinh "làm chuyện ấy" tình dục không được bảo vệ như "âm trện" tình dục không sử dụng bao cao su, nữ giới bị cưỡng hiếp hoặc liệu có lấy phương pháp bảo vệ khác biệt tuy vậy hoang mang bất thành. (1)

Đối tượng chính của thuốc kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp chứa hàm số lượng không nhỏ hormone sinh dục chị em Progesterone. Nguyên tắc tránh thai giống như thuốc ngừa thai thường xuyên, song sự khác hàm lượng Progestin chủ yếu là điểm khác, giúp cho dạng thuốc kháng sinh này chẩn đoán công dụng phòng tránh thai mau chóng.

ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, bác sĩ chuyên khoa Trung tâm sản phụ khoa cơ sở y tế Tâm Anh TP.HCM cho rằng, kháng sinh tránh thai cấp tốc là cách hữu hiệu cho một số trường hợp "cấp bách" – có nguy cơ mang thai sau khi nảy sinh quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Có 3 nhóm đối tượng sử dụng thường bắt gặp nhất là:

- Nhóm thứ nhất: người không liên tiếp quan hệ tình dục, cơ thể chưa có hoặc không thể lấy những giải pháp phòng chống có bầu ngoài mong muốn như sử dụng kháng sinh tránh thai hàng ngày, đặt khoảng ngừa thai, sử dụng miếng dán ngừa thai hoặc chưa có sẵn

bao lớn su...

- Nhóm thứ hai: người mắc hiếp dâm hoặc cưỡng bức dẫn ra việc "yêu" tình dục cần không muốn có bầu.
- Nhóm thứ ba: cơ thể đã từng sử dụng một số cách ngừa thai khác biệt song lo sợ không thành công, chẳng hạn như quên sử dụng thuốc kháng sinh phòng tránh thai liên tục, lấy thuốc tiêm phòng tránh thai song khoảng thời gian tiêm mắc trễ so đối với chu kỳ quy định, bao cao su mắc thủng hay mắc rách...

Thống kê cho biết, thuốc ngừa thai khẩn cấp cho kết quả tránh thai lên tới 90% trong tầm một ngày trước tiên sau lúc nảy sinh quan hệ tình dục không an toàn. Nếu mà lấy càng muộn dưới khi "làm chuyện ấy" hiệu quả tránh thai càng tổn ít hơn. Tùy loại thuốc mà hiệu quả ngừa thai sẽ không còn Nếu mà vượt quá khoảng thời gian phỏng đoán phép: 120 giờ (5 ngày) hay 72 giờ (3 ngày). (2)

- trasparenza.provincia.caserta.it:81/web/suckhoe24gio/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-thai-ha
- [phòng khám thái hà có tốt không](#) [phòng khám tư nhân hà nội bệnh viện nam khoa hà nội chữa yếu sinh lý ở đâu](#) [khám xuất tinh sớm ở đâu tốt nhất](#) [cắt hẹp bao quy đầu ở đâu](#) [cắt bao quy đầu mất bao nhiêu tiền](#) [khám trĩ chi phí](#) [cắt trĩ](#) [khám phụ khoa ở đâu tốt nhất](#) [hà nội khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền](#) [phá thai chi phí](#) [phá thai an toàn](#) [phòng khám phá thai](#) [khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu](#) [chi phí điều trị sùi mào gà](#) [chữa hôi nách ở đâu tốt](#) [phòng khám thái hà có tốt không](#) [khám đa khoa ở đâu tốt](#) [địa chỉ khám nam khoa uy tín ở hà nội](#) [chữa bệnh yếu sinh lý ở đâu tốt nhất](#) [tại Hà Nội](#) [chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu](#) [Hà Nội](#) [cắt bao quy đầu ở đâu](#) [hà nội](#) [chi phí](#) [cắt bao quy đầu ở bệnh viện](#) [khám bệnh trĩ](#) [chữa bệnh trĩ](#) [mất bao nhiêu tiền](#) [khám phụ khoa ở đâu](#) [khám phụ khoa](#) [bao nhiêu tiền](#) [cách phá thai nhanh nhất](#) [phá thai bằng thuốc](#) [hết bao nhiêu tiền](#) [hút thai ở đâu](#) [chữa sùi mào gà ở đâu tốt](#) [chi phí](#) [đốt sùi mào gà](#) [bệnh lậu](#) [khám ở đâu](#) [khám bệnh giang mai](#) [trị hôi nách ở đâu](#)

Cơ chế vận động của thuốc kháng sinh ngừa thai khẩn cấp

Khi được đưa vào cơ thể, các thành phần nội tiết có trong thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ dẫn tới chi phối, khiến cho trở ngại việc trứng rụng thiên nhiên ở phái đẹp, nhờ đó ngăn cản quá trình bắt gặp gỡ cũng như xảy ra thụ thai giữa trứng cũng như tinh binh.

Trong trường hợp trứng đã thụ thai, thuốc kháng sinh sẽ ngăn không cho chẩn đoán nội mạc dạ con trở thành cửa sổ gây tổ, ngăn cản vấn đề khiến tổ của phôi thai trong lòng dạ con. Nếu như việc khiến cho tổ đã tiếp diễn, kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp không làm cho đứt đoạn quá trình mang thai.

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo nhấn mạnh, cần phân loại rõ ràng thuốc phòng tránh thai khẩn cấp và thuốc bỏ thai. Thuốc kháng sinh ngừa thai cấp tốc KHÔNG cần phải là thuốc kháng sinh bỏ thai. Cơ chế hoạt động của thuốc tránh thai khẩn cấp chủ yếu là ngăn cản không cho biết tình trùng gặp trứng bằng phương pháp ngăn cản việc rụng trứng. Tức là thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ ngăn cản việc có bầu, không phải kết thúc việc mang bầu.

Một số loại thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp bách thường thấy Thực tế hiện nay

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo cho thấy, kháng sinh phòng tránh thai cấp bách Bổ sung hữu hiệu ngừa thai tối đa Nếu dùng Tức khắc dưới lúc phát sinh giao hợp không được bảo vệ. Thực tế hiện nay, Trên đây thị trường có nhiều dạng thuốc kháng sinh, hay gặp nhất là dạng 72 giờ và 120 giờ, ít thường bắt gặp hơn là một số loại một ngày, 36 giờ hoặc 48 giờ. (3)

Một số loại kháng sinh ngừa thai cấp bách được phân dạng thành loại một viên hay loại 2 viên, Vì thế phương pháp dùng cũng khác nhau.

Kháng sinh tránh thai cấp bách kiểu một viên

Kháng sinh tránh thai cấp tốc loại một viên được không ít cơ thể chọn bởi độ hay gặp Vừa rồi thị trường cũng như tính tiện lợi khi dùng. Phần lớn một số viên kháng sinh dạng này chỉ cho kết quả phòng ngừa vấn đề mang thai phía ngoài ý định Nếu mà sử dụng trong vòng 72 giờ (3 ngày) sau lúc nảy sinh giao hợp tình dục không an toàn.

Theo thống kê, khoảng thời gian dùng thuốc càng kịp thời thì hiệu quả phòng tránh thai càng cao. Rõ ràng là:

- Sử dụng thuốc trong vòng 24 giờ ban đầu tiên: hữu hiệu ngừa thai là 90%;
- Từ 25-48 giờ tiếp theo: hiệu quả tránh thai là 85%;
- Từ 49-72 giờ tiếp theo: hữu hiệu phòng tránh thai là 58%;

- Vượt quá 72 giờ: Nếu mà trứng cùng với tinh binh đã thụ tinh cũng như làm tổ trong tử cung, kháng sinh không còn công dụng bảo vệ.

Một số nhãn hiệu thuốc phòng tránh thai loại một viên đang thường bắt gặp Trên đây thị trường gồm:

- Postinor-1®: liệu có thành phần Levonorgestrel hàm lượng một,5mg, liều sử dụng 1 viên duy nhất.
- Mifestad 10®: thành phần đựng Mifepristone (chất đối kháng Progestin) hàm số lượng 10mg cho hiệu quả ngừa thai an toàn.
- Bocinor®: thành phần Levonorgestrel hàm số lượng một,5mg đóng gói kiểu một viên nén/1 vỉ.
- Lys®: đựng Levonorgestrel hàm số lượng 0,75mg, thường hay lấy cho biết tình huống không "lâm trận" liên tục hoặc có "làm chuyện ấy" tình dục đột xuất.
- Ciel EC 25®: khoa học kết luận tình huống "lâm trận" tình dục lần thứ nhất không dùng biện pháp tránh thai, bị hiếp dâm hay cưỡng bức quan hệ tình dục.
- Naphamife®: một nhãn hiệu kháng sinh được tạo ra ở Việt đấng mà rêu, thì có đối tượng Mifepristone 10mg Cùng với rất nhiều tá dược.

Kháng sinh ngừa thai cấp tốc kiểu 2 viên

Thuốc tránh thai dạng 2 viên ít thường thấy hơn. Quy phương pháp đóng gói 2 viên thuốc/hộp, từng viên đựng 0,75mg Levonorgestrel. Viên thứ nhất sử dụng càng sớm càng tốt dưới khi phát sinh giao hợp không được bảo vệ, không vượt quá 72 giờ. Viên thứ hai sử dụng dưới viên thứ nhất 12 giờ, không Nhầm quá 16 giờ. Thuốc chỉ Bổ sung hiệu quả tránh thai khi cơ thể dùng sử dụng không thiếu và đúng 2 viên theo thời điểm quy chuẩn.

Các nhãn hiệu thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp bách loại 2 viên thường bắt gặp Vừa rồi thị trường gồm:

- Postinor-2®: Nhãn hiệu thuốc thường gặp nhất, gồm 2 viên nén đựng đối tượng Levonorgestrel hàm lượng 0,75mg tại từng viên.
- Happynor®: Nhãn hiệu thuốc được sản sinh ở Việt cánh mà rêu, 1 hộp thuốc bao gồm 2 viên, từng viên đựng hàm lượng 0,75mg Levonorgestrel.
- Posinight 2®: thành phần và cơ chế nguy hiểm giống 2 nhãn hiệu Trên.

Chuyên gia Thanh Thảo nhấn mạnh, lúc uống thuốc tránh thai cấp bách, người lấy nên biết rõ bản thân sử dụng kiểu một viên hay 2 viên Nhầm

dùng đúng, hạn chế việc dùng sai làm mất hiệu quả tránh thai.

Hiệu quả của thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp bách sau lúc sử dụng

Thường thì, chị em phụ nữ không mang bầu Tức khắc sau lúc liệụ có giao hợp tình dục. Tinh trùng sẽ sống sót trong cơ thể người nữ giới trong khoảng 5 ngày. Tại thời gian đó, Nếu tiếp diễn tình trạng trứng rụng, tinh binh gặp trứng cũng như thụ thai sẽ cho hiệu quả mang bầu. (4)

Kháng sinh tránh thai cấp tốc liệụ có nhiệm vụ cản trở quá trình rụng trứng tự nhiên diễn ra, ngăn không chặn đoán buồng trứng bắt thích trứng. Hàng đầu Vì thế, Nếu như trứng đã từng rụng, trứng và tinh trùng đã từng thấy nhau, từng thụ tinh và đã gây tổ trong niêm mạc dạ con thì thuốc mất đi công dụng.

Đó chính là lý vì vì sao những bác sĩ chuyên khoa y học khuyên rằng nữ giới cần sử dụng càng kịp thời càng tốt dưới lúc nảy sinh quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su Nếu không muốn có bầu.

Nhưng, tìm hiểu cho thấy tầm 1-2% trường hợp phái đẹp sử dụng thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp bách vẫn mang bầu Cho dù đã sử dụng thuốc trong vòng 72 giờ (3 ngày) dưới lúc phát sinh "âm trậñ" tình dục không an toàn.

Có nghĩa là, thuốc ngừa thai khẩn cấp không bảo vệ đặc biệt được tất cả các trường hợp mang thai phía ngoài mong muốn. Nếu sau khi sử dụng thuốc kháng sinh ngừa thai không xuất hiện xuất hiện nguyệt san truy cập chu kỳ kinh tiếp, chị em phụ nữ nên kiểm tra kịp thời Nhằm được định vị chắc hẳn việc có thai hay không.

Cần phải uống thuốc kháng sinh ngừa thai lúc nào?

Thuốc phòng tránh thai khẩn cấp nên dùng trong một số trường hợp phát sinh giao hợp tình dục không sử dụng bao cao su mà không muốn có bầu. Cụ thể là:

- Không có hoặc chưa thể lấy biện pháp phòng tránh thai nào.
- Bị hiếp dâm hay cưỡng bức "âm trậñ" tình dục không sử dụng bao cao su.

- lo ngại về chức năng tránh thai không thành công lúc lấy phương pháp phòng tránh thai khác biệt như:
 - Bao lòn su bị rách, thủng, tụt hoặc lấy không đúng phương pháp.
 - Quên uống thuốc kháng sinh phòng tránh thai phối hợp Khoảng 3 viên trở lên hay trễ kinh 3 ngày so với chu kỳ thường thì.
 - Chậm 3 giờ so đối với thời điểm sử dụng kháng sinh hàng ngày chỉ chứa Progestin.
 - Chậm trễ kinh 1 tuần với kháng sinh phòng tránh thai loại tiêm phối hợp.
 - Lộn khoảng phòng tránh thai hoặc que cấy phòng tránh thai nội đào thải tố.
 - Rút "cậu nhỏ" bất thành, như bắn tinh đăng nhập âm hộ hay Trên đây cơ quan sinh dục phía ngoài.
 - Đặc tính toán sai lệch thời gian kiêng cử.

Những tác dụng phụ khi dùng kháng sinh tránh thai cấp tốc

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo cho rằng, Dù cho kháng sinh phòng tránh thai cấp bách đạt hiệu quả phòng tránh thai mau chóng cùng với hữu hiệu lên tới 90%, tuy vậy Nếu dùng sai lầm giải pháp hoặc dùng quá nhiều thuốc kháng sinh có nguy cơ gây nhiều phản ứng phụ, nhiều ngày có thể gây rất nhiều hệ lụy nặng nguy hiểm tới sức khỏe người sử dụng.

Một số tác dụng phụ hay gặp của thuốc ôm:

- **Biến đổi chu kỳ kinh nguyệt nguyệt:** Là phản ứng phụ thường thấy nhất, có nguy cơ thấy Liền Khoảng lần đầu tiên uống thuốc kháng sinh ngừa thai hoặc dưới không ít lần dùng. Nữ giới có thể xuất hiện kinh nguyệt đến kịp thời hơn hay muộn hơn so với chu kỳ bình thường. Nếu như muộn hơn 7 ngày, nữ giới nên lấy que thử hay kiểm tra với chuyên gia Nhằm được làm các xét nghiệm cấp thiết, xác định chắc hẳn việc có bầu hoặc không.
- **Chảy máu tử cung bất thường:** một vài tình huống phụ nữ bị ra máu dưới uống thuốc kháng sinh, Như là tác dụng phụ sẽ mau chóng tan biến. Nếu dưới 2 ngày vẫn mắc chảy máu, nữ nên xét nghiệm Tức thì Để loại trừ nguy cơ bị bệnh lý nghiêm trọng.
- **Sây sẩm mặt mày, mót nôn, nôn:** tầm 50% tình huống mắc phải hiện tượng này, song chị em không nên lo sợ, triệu chứng sẽ tự biến mất dưới 1-2 tuần hoặc kịp thời hơn. Nếu mà sau khoảng thời gian Trên

đây dấu hiệu không nâng cao, phải đẹp nên xét nghiệm Để xác định nguyên nhân tiềm ẩn khác biệt.

- Đau bụng dưới: Số ít tình huống mắc phải triệu chứng đau bụng dưới quần quai. Trong trường hợp này, phải đẹp cần xét nghiệm sớm Để tìm nguyên nhân chuẩn xác của dấu hiệu nhận biết, loại trừ căn nguyên có thai phía ngoài dạ con - 1 biến chứng có khả năng bị phải Nếu ngừa thai thất bại bằng phương pháp uống kháng sinh ngừa thai khẩn cấp.
- Trường hợp lạm dụng thuốc quá độ khiến cho người không dung nạp kháng sinh có thể khiến phụ nữ gặp những phản ứng phụ lâu ngày không giống như căng thẳng hay trầm cảm, Tăng cân không tự chủ, thay đổi huyết áp và hô hấp...

Chuyên gia Thanh Thảo khuyên rằng nữ hạn chế dùng quá nhiều uống thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp bách, chỉ dùng trong tình huống thật sự cấp thiết. Tốt nhất cần phải vận dụng ý kiến bác sĩ Để được trả lời, chỉ định giải pháp phòng tránh thai khoa học cũng như an toàn.

Ai có nguy cơ dùng kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp?

Phần lớn phụ nữ Thường xuyên có thể sử dụng kháng sinh tránh thai khẩn cấp, gồm những trường hợp không thể lấy biện pháp phòng tránh thai nội đạo thải tố như thuốc phòng tránh thai hàng ngày hay lát dán phòng tránh thai.

Nhưng mà, chị em phụ nữ không nên dùng thuốc ngừa thai cấp tốc Nếu mà dị ứng đối với bất cứ đối tượng nào của thuốc kháng sinh, hay bị bệnh lý có nguy cơ tương tác với kháng sinh. Thông báo bệnh tình lý hay dị ứng với bác sĩ, dược sĩ Để được tư vấn dùng có an toàn hoặc không.

Những tình huống chống chỉ dẫn với thuốc tránh thai cấp tốc

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo nhấn mạnh, một số trường hợp bài viết này tránh lấy thuốc ngừa thai cấp tốc, bao gồm:

- Chị em đang mang thai hoặc nghi ngờ mang thai;
- Nữ giới thấy hiện tượng chảy máu âm đạo bất thường mà không Rõ rệt nguyên nhân;

- Phái đẹp liệu có tiền sử bệnh nhiễm tắc mao mạch hay bệnh huyết khối.

Các tình huống cần thận trọng lúc uống kháng sinh phòng tránh thai, tốt hơn hết nên thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ Nhằm được tư vấn kỹ càng, gồm:

- Phụ nữ bị bệnh tiểu đường thì có biến chứng;
- Chị em phụ nữ liệu có tiền sử rối loạn lưu thông máu não;
- Chị em mắc bệnh tim mạch, bệnh động kinh...

Những lưu ý khi sử dụng thuốc kháng sinh tránh thai khẩn cấp

Thuốc kháng sinh tránh thai cấp tốc thì có hai mặt lợi cũng như hại rõ rệt, Do đó phái đẹp nên trang mắc phỏng đoán chính mình những thông tin về biện pháp lấy Nhằm bảo vệ sức khỏe mình. Sau đây là những lưu ý khi dùng thuốc chị em nên biết:

- Chỉ sử dụng thuốc kháng sinh trong tình huống thực sự quan trọng. Đọc kỹ lưỡng chỉ dẫn sử dụng hay tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ trước khi dùng. Không uống quá 2 lần/tháng cũng như 3 lần/năm Nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của chị em phụ nữ.
- Cần phải dùng thuốc kháng sinh sớm nhất sau khi phát sinh "làm chuyện ấy" tình dục không an toàn Để cho kết quả phòng tránh thai dài nhất.
- Uống rất nhiều viên thuốc ngừa thai khẩn cấp không khiến cho Nang cao hữu hiệu ngừa thai, Bên cạnh đó Tăng nguy cơ bắt gặp tác dụng phụ nặng nề bởi vì người không hấp thụ kháng sinh. Do đó, phụ nữ chỉ nên sử dụng không thiếu cũng như đúng theo khuyến cáo.
- Không sử dụng kháng sinh trong một số tình huống đang mang bầu hoặc nghi ngờ mang thai, đang trị chứng bệnh như đái tháo đường, tim mạch, động kinh, rối loạn tuần hoàn máu não...
- Trong tình huống thấy phản ứng phụ dưới dùng thuốc kháng sinh, Nếu như những dấu hiệu nhận biết kéo dài đối với tần suất thất thường, chị em cần kiểm tra Ngay Để dạng trừ những tình huống chứng bệnh nghiêm trọng.

Một số bản khoăn hay gặp

Một. Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp có mang bầu không?

Không có một phương pháp phòng tránh thai nào đạt kết quả tránh thai 100%. Thống kê cho rằng, tầm khoảng 1-2% trường hợp vẫn mang bầu Dù dùng kháng sinh ngừa thai Ngay sau lúc quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su.

Bởi vì thế, dưới khi sử dụng thuốc kháng sinh, Nếu nhận thấy "rụng rêu" đến trễ hơn 7 ngày so với những ngày kinh nguyệt bình thường, phải đẹp cần dùng que thử thai hay kiểm tra đối với bác sĩ chuyên khoa Nhằm được khiến các thăm khám cần thiết, định vị chắc chắn có có bầu hoặc không.

2. Sử dụng thuốc ngừa thai cấp tốc có đe dọa khả năng có bầu sau này không?

Cơ chế hoạt động của thuốc kháng sinh là trở ngại việc rụng trứng tự nhiên, không làm cho đứt đoạn việc phát triển của phôi thai trong tình huống trứng từng thụ thai cùng với gây tổ trong niêm mạc dạ con. Chính Chính vì vậy, thuốc phòng tránh thai cấp bách không khiến cho ảnh hưởng tới khả năng có thai của chị em phụ nữ về sau.

3. Làm sao Nhằm biết kháng sinh ngừa thai cấp bách thì có hữu hiệu hay không?

Dưới lúc dùng thuốc, Nếu như xuất hiện "đèn đỏ" vẫn thấy như những chu kỳ thông thường, Đó là dấu hiệu phòng tránh thai thành tựu. Tuy vậy, Để có kết quả chắc chắn, chị em phụ nữ cần đợi ít nhất một vài tuần, Rồi lấy que thử Nhằm kiểm chứng ngừa thai thành tựu hay không.

4. Liệu có nên dùng nhiều viên kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc Để Tăng hữu hiệu phòng tránh thai không?

Câu trả lời là không. Dùng rất nhiều viên Cùng lúc không làm Tăng hữu hiệu ngừa thai, Ngược lại còn làm cho Tăng khả năng thấy rất nhiều tác dụng phụ nặng nề vì người chưa thể hấp thu. Không ít trường hợp lạm dụng thuốc có nguy cơ xuất hiện biểu hiện không dễ chịu tại dạ dày. Khuyến cáo chỉ nên dùng tối đa 2 viên/tháng hoặc 3 viên/năm Nhằm đảm bảo không đe dọa đến chức năng sinh sản của chị em phụ nữ.

Tình huống mắc nôn sau khi dùng thuốc, cần phải quan sát thời gian nôn sau lúc sử dụng thuốc bao nhiêu lâu. Nếu như mắc nôn trong vòng 1 giờ,

chị em có khả năng uống thêm một viên Để giữ gìn hữu hiệu tránh thai.

5. Lúc nào yêu cầu thấy bác sĩ?

Dưới khi sử dụng thuốc kháng sinh phòng tránh thai, Nếu mà gặp phải bất cứ dấu hiệu nhận biết nào dưới đây, chị em phụ nữ cần tới Ngay bệnh viện đa khoa Để được chuyên gia thăm khám và giải quyết kịp thời. Những dấu hiệu nên đặc biệt chú ý gồm:

- Đau đầu, chóng mặt, kém hay mắc tê;
- Nhạt mắt, suy giảm thị lực, nói chuyện không dễ khăn;
- Cảm giác đau ngực, không dễ dàng thở;
- Đau đốn bụng nặng;
- Đau đốn nhiều ở bắp chân hoặc đùi.

Dù cho là biện pháp ngừa thai hữu hiệu cho những trường hợp “cấp bách”, song thuốc kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp cũng là “con dao hai lưỡi”, có khả năng gây ra rất nhiều hậu quả đe dọa nặng nề tới tính mạng cũng như khả năng sinh con của chị em phụ nữ. Hàng đầu Chính vì vậy, nữ không nên sử dụng nhiều thuốc. Tham khảo ý kiến chuyên gia Nhằm được tư vấn phương pháp phòng tránh thai tiên tiến khoa học cũng như an toàn.

Trung tâm phụ khoa hệ thống bệnh viện chuyên khoa Tâm Anh hội tụ hệ thống bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa giỏi chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng đi cùng Với chị em trong phục vụ tính mệnh sinh sản cũng như dự định hóa gia đình.